


R-tyflam

PIROXICAM



Denominación Distintiva: R-TYFLAM®

Denominación Genérica: Piroxicam.

Forma farmacéutica: Gel 0.5%.

Fórmula: Cada 100 g contienen:
Piroxicam 0.5 g
Vehículo cbp 100.0 g

Indicaciones: Alivia la inflamación y el dolor de padecimientos reumáticos y musculares como golpes, desgarros, esguinces, torceduras, luxaciones, dolor post-traumático, dolor lumbar etc.

Dosis y modo de empleo: Aplicar 5 cm de gel en el área lesionada 3 ó 4 veces al día. Aplique una pequeña cantidad en el área afectada. Frótelo hasta que desaparezca totalmente para que penetre el alivio. Una aplicación con ligero masaje, 2 o 3 veces al día ayuda a una más rápida recuperación.

Vía de administración: Cutánea. Penetra fácilmente en piel, músculo y articulaciones.

Uso en el embarazo y lactancia: No se use en el embarazo, lactancia ni en niños menores de 12 años.

Contraindicaciones: Alergia a los antiinflamatorios o al ácido acetilsalicílico.

Reacciones secundarias y adversas: R-tyflam® Gel es bien tolerado; en ocasiones y en una mínima porción puede presentarse enrojecimiento, edema localizado, erupción o ardor. Si persisten las molestias consulte a su médico.

Precauciones y advertencias: R-tyflam Gel sólo debe administrarse en la piel intacta y no sobre heridas abiertas. Evítese el contacto con los ojos y mucosas. Lávese las manos después de su aplicación.

Hecho en México por:

FARMACÉUTICOS RAYERE, S.A.
Emiliano Zapata No. 72, Col. Portales
C.P. 03300, Deleg. Benito Juárez
D.F., México



Reg. No. 003M99 SSA VI