

VOMISIN[®]

DIMENHIDRINATO



Denominación Distintiva: VOMISIN[®]

Denominación Genérica: Dimenhidrinato.

Forma farmacéutica: Tabletas.

Fórmula: Cada tableta contiene:
Dimenhidrinato 50 mg
Excipiente cbp 1 tableta

Indicaciones: Vomisin[®] es eficaz para el alivio del mareo por movimiento, náusea y vómito.

Dosis y modo de empleo: Para prevenir el mareo por movimiento, la primera dosis debe tomarse de hora y media a una hora antes de iniciar la actividad. Para náusea y vómito asociados a mareo por movimiento, seguir las siguientes dosis: Adultos y niños de más de 12 años de edad: 1 a 2 tabletas cada 4 a 6 horas, no excediendo de 8 tabletas en 24 horas o como lo indique el médico. Niños de 6 a 12 años de edad: 1/4 a 1/2 tableta cada 6 a 8 horas, no excediendo 1 1/2 tableta en 24 horas o como lo indique el médico.

Vía de administración: Oral.

Uso en el embarazo y lactancia: El empleo de Vomisin[®] durante el embarazo y lactancia queda bajo la responsabilidad del médico.

Contraindicaciones: No usar Vomisin[®] en recién nacidos y en pacientes con alergia al Dimenhidrinato o a cualquiera de sus componentes.

Reacciones secundarias y adversas: El uso de Vomisin[®] puede producir somnolencia y afectar el estado alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso.

Precauciones y advertencias: Vomisin[®] no debe ser usado por personas con glaucoma, enfermedad crónica pulmonar, dificultad para respirar o dificultad para orinar debido al ensanchamiento de la próstata, a menos que sea indicado por un médico.

Hecho en México por:
FARMACÉUTICOS RAYERE, S.A.
Emiliano Zapata No. 72, Col. Portales
C.P. 03300, Deleg. Benito Juárez
D.F., México

Reg. No. 90179 SSA VI