

NO PERMITAS QUE SUS
RECUERDOS SE **DESVANEZCAN**



PERDUQUAN®

MEMANTINA

HABLANDO SERIAMENTE DE DEMENCIA

LA **TENDENCIA** ES **ALARMANTE** SOBRE
EL **DETERIORO MENTAL** CON LA EDAD¹

- PERDUQUAN es un **bloqueador de los receptores NMDA** de baja afinidad, no competitivo que **evita la toxicidad neuronal** del glutamato **sin interferir con la acción fisiológica normal de la memoria y el aprendizaje.**²
- Al mejorar la autonomía, **la memantina puede reducir los costos y disminuir la carga global de la enfermedad** en cuanto a la asistencia.³

RECORDAR ES VIVIR DE NUEVO



INDICADO EN ESTADOS DE LAS **ALTERACIONES FUNCIONALES DEL SÍNDROME DEMENCIAL:**

- Demencia degenerativa tipo Alzheimer.
- Demencia vascular.
- Demencia de origen endocrino o metabólico.
- PERDUQUAN es seguro y bien tolerado por su **mecanismo de acción antagónico no competitivo de los receptores N-Metil-D-Aspartato (NMDA).**²
- Este mismo **mecanismo de acción está relacionado con la prevención de la muerte neuronal** inducida por los receptores NMDA.²

DOSIS:

La dosis máxima recomendada es de 20 mg al día.

- ▶ 1a semana 5 mg al día
- ▶ 2a semana 10 mg al día
- ▶ 3a semana 15 mg al día
- ▶ 4a semana 20 mg al día



PRIMUS® Primera elección por calidad, seguridad y precio

Emiliano Zapata No.72, Col. Portales, Del. Benito Juárez, C.P.03300, México, D.F. Tels.01 800 523 5615 - 5532 6020

Material exclusivo para Profesionales de la Salud | Registro Sanitario 229M2013 SSA | Aviso de Publicidad XXX

BIBLIOGRAFÍA:
1.-Demencia: una prioridad de salud pública. Washington, DC: OPS, 2013. 2. Hansen RA, et al. Drug Class Review of Alzheimer's Drugs. Final Report. 2006 <http://www.ohsu.edu/drugeffectiveness/reports/final.cfm> 3. Hoogveldt B et al. cost-effectiveness analysis of memantine for moderate-to-severe Alzheimer's disease in the Netherlands. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2011;7 313-317.

LA DEPRESIÓN

RESQUEBRAJA DÍA A DÍA...

Resteral[®]

Sertralina

EN ESTADOS **DEPRESIVOS** Y **TRASTORNOS** CON **COMPONENTE ANSIOSO**

- La **depresión es un trastorno mental frecuente**. Se calcula que **afecta a más de 300 millones** de personas en el mundo.¹
- La depresión es la **principal causa de discapacidad** y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad.¹

RESTERAL se recomienda para el tratamiento obsesivo compulsivo (TOC).²

RESTERAL INDICADO EN:²

- » **Depresión** incluida la **acompañada de ansiedad**.²
- » **Estrés Post traumático**.²
- » **Fobia social**.²
- » **Trastornos de pánico** con o sin agorafobia.²

RESTERAL es el candidato sólido para ser la opción inicial en personas con depresión mayor.³

- **Rápido control** de los síntomas.
- **Una sola toma** al día.
- **Costo ideal** para el tratamiento a largo plazo.

DOSIS:

- ➔ Habitualmente es de **50 mg al día en Depresión** y en **TOC en adultos**.
- ➔ En **adultos y niños de 6 a 17 con TOC** puede iniciarse tratamiento con **25 mg al día** y aumentarse cada semana a razón de **50 mg más al día**.
- ➔ En ningún caso se recomienda más de 200 mg al día.



BIBLIOGRAFÍA:

1.- Plan de acción sobre salud mental 2013-2020 OMS, Ginebra, Suiza, 2013. 2.- Información Para Prescribir Rasteral. 3.- Cipriani A et al. Sertraline versus other antidepressive agents for depression. Cochrane Database Syst Rev. ; (4): CD006117. doi:10.1002/14651858.CD006117.pub4.



PRIMUS Primera elección por calidad, seguridad y precio

Emiliano Zapata No.72, Col. Portales, Del. Benito Juárez, C.P.03300, México, D.F. Tels. 01 800 523 5615 - 5532 6020

Material exclusivo para Profesionales de la Salud | Registro Sanitario 264M2006 SSA | Aviso de Publicidad XXX