

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BROGAL®

AMBROXOL
PEDIÁTRICO

BROGAL® AMBROXOL

Solución
750 mg/100 mL
Pediátrico
Gotas

Fórmula:

Cada 100 mL contienen:

Clorhidrato de ambroxol 750 mg
Vehículo cbp 100 mL

Vía de administración:

Oral.

Consérvese a no más de 30 °C.

Consérvese el frasco bien cerrado.

Indicación terapéutica: Brogal® es auxiliar en la expulsión de las flemas.

Dosis y modo de empleo: Use Brogal® de la siguiente manera:

Niños de 1 año a 1 año 11 meses de edad: 1 mL cada 12 horas.

Niños de 2 a 6 años de edad: 1 mL cada 8 horas.

Niños de 6 a 12 años de edad: 2 mL cada 8 ó 12 horas.

No exceda la dosis recomendada

Uso en el embarazo y lactancia: No se use en el embarazo ni la lactancia.

Contraindicaciones: No se administre Brogal® a pacientes con úlcera gástrica o en pacientes alérgicos a los componentes de la fórmula.

Precauciones y advertencias:

-Uso pediátrico: No se use Brogal® en niños menores de 1 año.

-Reacciones secundarias y adversas: Brogal® ocasionalmente puede provocar diarrea, náuseas, vómito y gastritis.

-Interacciones medicamentosas y alimentarias: Al consumir Brogal® evitar alimentos que irriten el estómago (picante, bebidas alcohólicas, cátsup, mostaza, chocolate y café). El medicamento debe administrarse después de los alimentos.

Ingesta accidental y sobredosis: En caso de intoxicación con Brogal®, acudir al médico.

No se deje al alcance ni a la vista de los niños.

Contiene 20 por ciento de azúcar y 35.98 por ciento de otros azúcares.

Si persisten las molestias por más de cinco días o si presenta fiebre, consulte a su médico.

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800-523-5615, Ext. 157.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:

farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y fv@rayere.com.mx

Reg. No. 247M92 SSA VI

Marca registrada

Hecho en México por:

FARMACÉUTICOS RAYERE, S.A.

Emiliano Zapata No. 72, Col. Portales,

C.P. 03300, Benito Juárez,

Ciudad de México, México.

